

تاسو کولې شي د اغیزمنده contraception په واسطه د نه پلان شوي امیدواری څخه مخنیوی وکړئ. د contraception یا مخنیوی رنگار رنگ ډولونه شته. د ماشوم د زیږیدو نه وروسته تاسو کولې شي ځینې ډولونه د مخنیوی contraception نه استفاده وکړي. کله چې تصمیم نیسئ کوم ډول یې تاسو ته گټوره ده، ډیره مهمه ده چې وپوهیږئ:

- څه ډول کرڼه شتون لري
- څه ډول کار کوې
- په نا پلان شوي امیدواری مخنیوی کې به څرنگه کاروې
- تاسې کله کولې شي دهغه کارول پیل کړې
- گټي او نقصان
- په عین وخت کې چې خپل ماشوم ته تې ورکوې تاسې کولې شي کرڼه یا طریقه وکاروې

## سپارښت شوي ټاکنې که تاسې خپله تې ورکوې

کیدای شي خپله شیدې ورکول د مخنیوی contraception یو طریقه وي. که تاسې غواړې چې خپله تې ورکول یو طریقه د مخنیوی contraception وي خپله ډاکټریا نرس سره خبرې وکړې. که تاسو د تیونوپمپ څخه استفاده کوې دغه طریقه کارنه کوې. تې ورکول 98% په نه حامله کیدو کې اغیزه کوې که چیرې:

- دهغه وخت نه چې تاسې ماشوم زیږولې میاشتنی ناروغی نلري او
- ستاسې کوچنۍ د شپږو میاشتو نه لږه او
- تاسې یواځې تې ورکوې. دا په دې مانا چې تاسې خپل کوچنۍ ته اوچه شیدې یا کوم بل څښل یا خوراک نه ورکوې او
- تاسې په مرتب ډول سره خپله شیدې ورکوې. دا په دې مانا چې په ورځ کې هر 4 ساعته او په شپه کې هر 6 ساعته پس.
- که تاسې نه غواړې چې امید واره شي، تاسې باید د contraception مخنیوی بل ډول طریقی نه کارواخلې کله چې:
- ستاسې میاشتنی ناروغی راځي یا
- تاسې خپل کوچنۍ ته بل ډول خواړه ورکول یا څښل پیل کوې.
- کله چې تې ورکوې، کولې شي لاندې طریقه په امن سره وکاروې:

### The contraceptive implant امیدواری څخه مخنیوی القا کول

تاسې کولې شي د کوچنۍ د زیږیدو نه وروسته سمدلاسه د (ImplanonNXT®) contraceptive implant ولگوې.

### Intrauterine devices د رحم په دننه کې آله (IUD)

د کوچنۍ د زیږیدو نه وروسته څه نا څه څلور اونۍ باید تاسو انتظار وکړې چې وکولې شي د مس copper IUD هورموني hormonal IUD (Mirena® یا Kyleena®) داخل کړې. دوي ډیر زر کار کول کوې او د 99.2% او 99.8% د امید واری په مخنیوی کې اغیزمن دي. که تاسو ستونزه لري یا غواړې چې بل کوچنۍ ولري، دواړه ډول د IUD په ډیره آسانې سره کیدای شي د ډاکټر په واسطه لري شي.

### د contraceptive injection امیدواری نه مخنیوی پیچکارې کول

پس له دې نه چې ستاسې کوچنۍ وزیرید سمدلاسه (Depo Provera) امیدواری نه مخنیوی پیچکارې لگول پیل کړې. یواځې په ډیره لږه اندازه د دوا، د شیدو ورکولو لارې کوچنۍ ته انتقالیږي او دغه ډیره لږه اندازه د شیدو د تولید په مقدار کومه اغیزه نکوي. دغه پیچکارې شوي مقدار دوا چې امیدواری مخنیوی دپاره شوي د 94% او 99.8% ترمنځ دامیدواری په مخنیوی کې اغیزه کوې.

## د Progesterone Only Pill (POP or “mini pill”)

پس له دې چې ستاسې کوچنۍ وزیرید تاسې کولې شي سمدلاسه mini pill پیل کړې. د mini pill د 91% نه تر 99.7% دامیدواری په مخنیوي کې اغیزمنده ده.

### Condoms پوښ

څرنګه چې مو جنسي رابطه بیرته پیل کړه تاسې کولې شي ښځینه اونارینه کانډوم نه کار واخلې. کانډوم د امید واری څخه مخنیوي کوي او دجنسی اړیکو د میکروب (STIs) په نه انتقال کې غټه ساتنه کوي. دغه کار د 79% نه تر 82% پورې د امیدواری په مخنیوي کې اغیزمنده ده. تاسې کولې شي ښځینه کانډوم آنلاین یا د Family Planning NSW څخه وپلورې.

### The diaphragm حجاب یا پرده ایښودل

پس له هغه چې ماشوم مو وزیرید تاسې کولې شي شپراوني وروسته د (Caya®) نازک سایز پرده single size diaphragm وکاروې.

### Natural family planning کورنۍ عادی پلانول

کورنۍ عادی پلانول فزیکي بدلونونه کوم چې د میاشتني ناروغی دوران کې پیښیږي نظارت کوي. دا کیدای شي تر 99% پورې اغیزمنده وي، مګر تر 76% پورې اغیزه کوي دا په هغه پورې تړلې دي چې تاسې څرنګه هغه استعمال اوکوم طریقه ټاکې. تاسې باید د کورنۍ عادی پلانولو یو ماهر specialist سره خبرې وکړې. دغه ماهر به ممکن په یوه وخت کې یونه ډیر ډولونو کارول سپارښتنه وکړي. کله چې تاسې ماشوم ته تی ورکوي کیدای شي سخته وي چې کورنۍ عادی پلان نتیجه ورکړي. همدا ډول کیدای شي کورنۍ عادی پلان کارول به تاسوسره چې امید واره شي مرسته وکړي.

### Sterilisation صفایي یا عقیم کول

صفایي کول Sterilisation دجراحی یودایمي طریقه د contraception دې چې 99% د امیدواری په مخنیوي کې اغیزمنده ده. میرمنې کولې شي tubal ligation درحم د نلونو تړل یا tubal occlusion ټاکنه وکړي. نارینه کولې شي vasectomy عقیم وکړي. دماشوم د زیږیدني نه اقل درې میاشتې وروسته د Tubal occlusion او tubal ligation جراحی عمل ډیره ښه ډول سره ترسره کیږي. په هر حال، سپارښتنه کیږي چې یوڅه نور وخت هم انتظار وکړئ. د یوکوچنۍ ماشوم پاملرنه به حوصله غواړي دابه ښه وخت نه وي چې دایمي فیصله عملې کړئ.

### Emergency contraception ګړندی مخه نیول

که تاسې غیرمحافظةوی سکس جنسي اړیکه وکړه اونه غواړي چې امیدوارشي، دماشوم دزیږیدونه 3 اونۍ وروسته تاسې باید ګړندی مخنیوي contraception emergency وکاروې. کله چې تی ورکوي (LNG) Levonorgestrel ګړندی مخه نیولودوا یوه ډیره ښه طریقه ده په دې چې یوه ډیره لږه مقدار د LNG ستاسې د تی په شیدوکې ځي. پس له دې چې (UPA) ګړندی مخه نیولودوا Ulipristal Acetate وخورل شي یو اونۍ دپاره تی ورکول سپارښتنه نه کیږي. په ځینو حالاتو کې کیدای شي د مس IUD ګړندی مخنیوي دپاره وکارول شي.

پس له دې چې تاسې غیرمحافظةوی سکس وکړ، تاسې باید زرتزره دګړندی مخنیوي دوا وخورې. په دې مانا چې 72 ساعتونه (درې ورځې) کې دننه د LNG دپاره یا 120 ساعتونو (پنځه ورځې) کې دننه د UAP دپاره ګړندی مخه نیول. کیدای شي ګړندی مخه نیول تر 85% پورې دامید واری په مخه نیولو کې اغیزمنده وي. اغیزوالې د ګړندی مخه نیولو د دوا خورلو پورې اړه لري چې څومره زرخورل کیږي. تاسې کولې شي د ګړندی مخه نیولودوا درملتون څخه د ډاکټر د نسخې پرته واخلې.

## ټاکنه چې لمړیو وختونو کې ورکولو کې سپارښت نه کیږي

لاندې میتودونه د contraception چې سپارښتنه نه کیږي ترڅوماشوم څه نا څه د شپږو اونیو عمر نه وي شوي، اویواځی پس له هغه چې خپل ډاکټر سره خبرې وکړي. دغو طریقې د ستروجن oestrogen لرونکې دي.

- ترکیب شوي تابلیت (تابلیت)
- مهبلې کړۍ (vaginal ring (NuvaRing®))

## که تاسې تی نه ورکوئ لارښونې چې سپارښتنه کيږي

که تاسې تی نه ورکوئ، کولئ شئ د مخنيوي contraception هرډول ټاکنه وکړئ. پس له هغه چې ستاسې کوچنۍ وزپريد، تاسې کولئ شئ د تابليتوخورل يا درې نه ترشپراونيوپورې مهبل کړۍ vaginal ring استعمال کړئ. مخه نيولو د پاره پيچکاري contraceptive injection او implant کيدای شي د ماشوم نه وروسته بې له ځنډه وکارول شي. نوروټولوپريکوډپاره، تی ورکونکې اونه تی ورکونکې ميرمنودپاره دپيل وخت يوشئ دې.

تاسې کولئ شئ خپله ډاکټريا نرس سره د مخنيوي contraception په هکله خبرې وکړئ. دوي به تاسوسره ديوخورا ښه تصميم په نيولوستاسوارتياوسره سم مرسته وکړي.

## که زه انگريزي خبروکلودپاره مرسته وغواړم څه وکړم؟

که تاسې د انگريزي په ژبه پوهيدل اوخبرې کولوته اړيې مسلکي ژباړونکې مرستې شتون لري. ژباړنې خدمتونه وريا اومحرمانه دي. که تاسې ژباړونکې ته اړياست لطفأ کارکونکوڅخه وغواړئ يا تاسې پخپله (TIS) ژباړنې خدمتونو سره په 131 450 کې اړيکه ونيسئ.

Family Planning Victoria©

نورومالوماتود پاره: Family Planning NSW

تلفون: 886 658 1300 [www.fpnsw.org.au](http://www.fpnsw.org.au)

دغه منبع د Family Planning Victoria په اجازه Royal Hospital for women د پاره ژباړنه وشوه.

### سيمه ييزاريکه Local Contact

نوم: Person's name:

\_\_\_\_\_

تلفون شميره: Contact number:

\_\_\_\_\_